

FICHA TÉCNICA - P/K BONSAI ALGAE



P/K BONSAI ALGAE (NOVA GAMA)

Adubo à base de Fósforo e Potássio, otimizado com Algas e Micronutrientes.

Pode ser aplicado de Fevereiro a Outubro, **reforçando no final do Inverno/ Início da Primavera** (de Fevereiro a Abril) e posteriormente no **final do Verão/ início do Outono** (Setembro a Outubro/Novembro).

O "Fósforo e o Potássio" desempenham um papel estimulante sobre as defesas naturais da planta, fortalecendo-as preventivamente contra fungos, bem como estimulam a floração e frutificação, o desenvolvimento radicular e lenhificam os tecidos preparando as árvores para o período Invernal.

A fórmula do "PK Bonsai" é otimizada através da inclusão de um "buffer" que garante a estabilidade do p.H. do produto, de forma a aumentar a sua disponibilidade, foram também incorporadas Algas e Micronutrientes que facilitam a assimilação do Fósforo e Potássio pela planta.

Aplicação e dose:

Manutenção: Aplicar quinzenalmente de Fevereiro a Outubro (DOSE PARA 1 LITRO de ÁGUA -1 tampa frasco 200 ml ou 10 ml do Frasco de 1 litro), com o solo previamente húmido, diretamente no solo e nas folhas (ideal em ambos se possível).

Reforço: Aplicar semanalmente na Primavera e Outono (DOSE PARA 1 LITRO de ÁGUA -1 tampa frasco 200 ml ou 10 ml do Frasco de 1 litro), com o solo previamente húmido, diretamente no solo e nas folhas (ideal em ambos se possível).

Não adubar plantas recentemente transplantadas (neste caso utilizar "Biobonsai").

Não aplicar via foliar em plantas com folhas muito débeis ou tenras, pois como qualquer adubo ou fortificante pode provocar ligeiras queimaduras, nestes casos aplicar só no solo.

Quando via foliar, aplicar após planta bem regada e hidratada, garantindo que a planta não apanha sol direto forte de seguida e que chega seca à noite.

Aguardar 3 dias entre a aplicação deste produto e de outros adubos ou fitossanitários, garantindo sempre que entre ambos existe uma rega de "lavagem das folhas".

Precauções especiais:

Manter fora do alcance das crianças e animais. em caso de contacto com os olhos, lavar abundantemente com água e sabão. em caso de ingestão, contactar o médico.

Composição:

N-P-K | 0 - 5 - 5

Algas - 1 %

Micronutrientes (EDTA):

Mn-0,2% | Mo-0,05% | Zn-0,2%

PRODUTO FERTILIZANTE UE

P/K BONSAI (GAMA ANTERIOR)

Adubo à base de fósforo e potássio (na forma de ião fosfito potássico), em proporção ideal para uso em bonsai, no solo e via foliar, desde Fevereiro a Outubro, com ação preventiva e de combate sobre as carências.

O "Fósforo e o Potássio" desempenham um papel estimulante sobre as defesas naturais da planta, fortalecendo-as preventivamente contra fungos, bem como estimulam a floração e frutificação, o desenvolvimento radicular e lenhificam os tecidos preparando as árvores para o período Invernal.

Embora possa ser aplicado ao longo de toda a época de crescimento, é essencial no final do Inverno (Fevereiro a Março) e posteriormente no Final do Verão (Setembro a Outubro).

Não adubar plantas recentemente transplantadas (neste caso utilizar "Biobonsai").

Não aplicar via foliar em plantas com folhas muito débeis ou tenras, pois como qualquer adubo pode provocar ligeiras queimaduras, nestes casos aplicar só no solo.

Quando via foliar, aplicar após planta bem regada e hidratada, garantindo que a planta não apanha sol directo forte de seguida e que chega seca à noite.

Aguardar 3 dias entre a aplicação deste produto e de outros adubos ou fitossanitários, garantindo sempre que entre ambos existe uma rega de "lavagem das folhas".

Precauções especiais:

Manter fora do alcance das crianças e animais. em caso de contacto com os olhos, lavar abundantemente com água e sabão. em caso de ingestão, contactar o médico.

Modo de aplicação e dose

Manutenção: Aplicar quinzenalmente (**DOSE PARA 1 LITRO de ÁGUA -1 tampa frasco 200 ml ou 10 ml do Frasco de 1 litro**), com o solo previamente húmido, diretamente no solo e nas folhas (ideal em ambos se possível).

Combate a carências: Aplicar semanalmente (**DOSE PARA 1 LITRO de ÁGUA -1 tampa frasco 200 ml ou 10 ml do Frasco de 1 litro**), com o solo previamente húmido, diretamente no solo e nas folhas (ideal em ambos se possível), manter a periodicidade até ao total desaparecimento dos sintomas na nova brotação.