



ICHA TÉCNICA — PUNICA GRANATUM

PUNICA GRANATUM

Flores, frutos e carácter mediterrânico

Nome científico: *Punica granatum*

Nome comum: Romãzeira

Família: Lythraceae

Tipo: Caducifolia

Origem: Ásia Ocidental, amplamente cultivada na região mediterrânica

Localização: Exterior

Nível de dificuldade: Fácil a intermédio

Características

A Romãzeira reúne muitas características interessantes para bonsai: folhagem relativamente pequena, floração intensa, capacidade de frutificação e troncos que adquirem carácter com a idade.

As flores, normalmente em tonalidades vermelhas a alaranjadas, podem originar os característicos frutos.

É também uma espécie com uma forte ligação à paisagem mediterrânica.

Exposição

Cultive no exterior, preferencialmente num local muito luminoso e soalheiro.

Uma boa exposição solar é particularmente importante para favorecer crescimento saudável, floração e maturação dos frutos.

Em períodos de calor extremo, esteja especialmente atento à rega dos exemplares cultivados em vasos pequenos.

Proteja de geadas fortes.

Rega

Regue abundantemente quando o substrato começar a perder humidade.

Durante a floração, formação dos frutos e períodos de calor, as necessidades de água podem aumentar.

Evite tanto a secagem prolongada como o encharcamento permanente.

Adubação

Adube regularmente durante a estação de crescimento, ajustando a fertilização ao vigor e objetivo da árvore.

Quando pretendemos favorecer floração e frutificação, devemos evitar um excesso de azoto, que pode estimular demasiado crescimento vegetativo.

Recomendação do Atelier

Na fase adequada do ciclo, recomendamos o nosso P/K Bonsai como complemento nutricional para apoiar a floração e favorecer a frutificação, seguindo sempre as indicações de utilização do produto.

→ Conhecer o P/K Bonsai

Poda

A Romãzeira responde bem à poda e pode produzir crescimento vigoroso.

Quando pretendemos obter flores e frutos, a poda deve ser planeada para não eliminar indiscriminadamente os rebentos que participarão na floração.

Aramação

Os ramos jovens podem ser aramados.

Tenha atenção ao engrossamento durante a estação de crescimento e retire o arame antes que provoque marcas.

Transplante

Preferencialmente no início da primavera, quando a árvore começa a retomar a atividade.

A frequência dependerá do vigor, idade, estado das raízes e dimensão do vaso.

Substrato

Necessita de boa drenagem e arejamento, mantendo simultaneamente humidade suficiente entre regas.

Recomendação do Atelier

Recomendamos a Mistura de Solo para Folhosas do Atelier do Bonsai.

→ Conhecer a Mistura de Solo para Folhosas

Pragas e doenças

Observe regularmente folhas, rebentos, flores e frutos.

Pulgões, cochonilhas e outros insetos sugadores podem surgir.

Boa circulação de ar e observação frequente são importantes medidas preventivas.

Frutificação

Os frutos constituem uma das características mais interessantes da Romãzeira, mas representam também um investimento energético para a árvore.

Num exemplar jovem, debilitado ou recentemente transplantado, poderá ser aconselhável reduzir a quantidade de frutos para privilegiar a recuperação e o desenvolvimento vegetativo.

Conselho do Atelier

Não devemos procurar fruta a qualquer custo.

Primeiro cultivamos uma árvore saudável; depois permitimos que a floração e a frutificação valorizem o bonsai.

Produtos recomendados pelo Atelier

Mistura de Solo para Folhosas

P/K Bonsai — complemento nutricional para as fases adequadas de floração e frutificação.

💎 UMA ÁRVORE. UM EXEMPLAR. UMA HISTÓRIA ÚNICA.

→ Descubra as Punica granatum disponíveis no Atelier do Bonsai